

Introduzione al sistema climatico terrestre

Studio e previsioni dello stato del sistema



*Federico Porcù (federico.porcu@unibo.it)
Dipartimento di Fisica e Astronomia
Università di Bologna*

definizione del problema;
evidenze della tendenza climatica;
discussione;

sistemi dinamici;
il sistema climatico terrestre;
un approccio osservativo.

CLIMA E TEMPO METEOROLOGICO

diversa scala temporale

diversità di metodo, dati e formulazioni teoriche

tempo meteorologico *stato di un sottosistema (in particolare dell'atmosfera) ad un preciso istante.*

clima *stato medio del sistema e sue variazioni nel tempo.*

temperatura dell'aria

altezza del mare

precipitazione, vegetazione, insolazione,
estensione dei ghiacci,

temperatura dell'aria ($h=2\text{ m}$)

termometri (tempi recenti < 200 anni):

termometri a mercurio

termometri a stato solido (termistori)




proxy data (paleoclima):


anelli di accrescimento degli alberi

forma delle foglie

$\text{O}^{16}/\text{O}^{18}$

cronache storiche







La scienza è fatta di dati come una casa di pietre.

Ma un ammasso di dati non è scienza più di quanto un mucchio di pietre sia una casa.


-Henri Poincaré-




4.5 MILIARDI




1 MILIONE DI ANNI




420.000 ANNI – Vostok Ice Core




420.000 ANNI – Vostok Ice Core



10.000 ANNI




1.000 ANNI



osservazione delle tendenze I


hockey stick (Mann, Bradley, Hughes, JGR, 1999)



osservazione delle tendenze II


stime della temperatura media dell'emisfero nord

NORTHERN HEMISPHERE TEMPERATURE RECONSTRUCTIONS




osservazione delle tendenze III

ultimi anni



osservazione delle tendenze III

GW hiatus




osservazione delle tendenze IV

relazione GHG/ΔT

le variazioni di contenuto di CO₂ seguono di circa 800 anni le variazioni della temperatura

Mudelsee, 2001




osservazione delle tendenze V

copertura globale dei sensori


la frazione di superficie globale monitorata varia

$$5^\circ \times 5^\circ \sim 550 \times 400 \text{ km}^2$$




osservazione delle tendenze VI

modifica dei siti di misura




osservazione delle tendenze VI osservazioni dallo spazio


0,2 K/decade



UAH Satellite-Based Temperature
of the Global Lower Atmosphere
(Version 5.5)




0,09 K/decade




osservazione delle tendenze VIII

Microwave Sounding Unit (MSU)







osservazione delle tendenze IX *ritiro dei ghiacciai*




osservazione delle tendenze X eventi estremi: cicloni tropicali

Deo et al., 2011




osservazione delle tendenze X

eventi estremi: cicloni tropicali



osservazione delle tendenze XI

*impatto sui
sistemi fisici e
biologici*



sistemi dinamici, non linearità, caos;
componenti e caratteristiche del sistema
climatico terrestre;
un approccio osservativo.

Il sistema climatico è un sistema complesso

non esiste una definizione univoca e generale
di sistema complesso

definiamo allora un sistema non complesso

sistema semplice o lineare o riducibile

sistema: insieme di elementi che interagiscono tra loro con un obiettivo seguendo proprie regole

linearità: l'effetto è proporzionale alla causa

riduzionismo: il sistema può essere compreso studiando separatamente le parti di cui è composto

caratteristiche di un sistema lineare:


- i componenti interagiscono tra loro in modo lineare;
- è riducibile;
- è predicibile;
- è descritto da pochi parametri.

caratteristiche di un sistema non lineare:

- non è possibile riconoscere il ruolo di ogni singolo elemento in un processo (meccanismi di retroazione);
- è non predicibile (caos, sensibilità alle condizioni iniziali);
- piccole perturbazioni possono dare grandi risposte e viceversa (mucchio di sabbia);
- fenomeni di auto-organizzazione (vortici, convezione).

Biliardo

sensibilità alle condizioni iniziali ($\Delta\phi = 0.5\%$)



Sistema di Lorenz

$$\dot{x} = \sigma(y - x)$$

$$\dot{y} = rx - y - xz$$

$$\dot{z} = xy - bz$$

$$x_{(t=0)} = 8$$


$$y_{(t=0)} = 1$$

$$z_{(t=0)} = 1$$

$$x_{(t=0)} = 8$$


$$y_{(t=0)} = 1.0000001$$

$$z_{(t=0)} = 1$$




$$x_t = x_{t-1}^2 - 2$$


$$x_o = 0.500000$$
$$x'_o = 0.500001$$




Biliardo ordine



Convezione (Benard)



The Global Climate System



caratteristiche del sistema climatico:

1) diversi sottosistemi con:

diversi scale spazio-temporali,
diverse metodologie di studio,
diversi livelli di conoscenza;

2) interazioni tra sottosistemi:

difficilmente osservabili,
poco studiate,

3) necessità di tempi “sperimentali” lunghi;

4) sistema caotico.

*The key to gaining a better understanding of the **global environment** is exploring how the Earth's systems of air, land, water, and life interact with each other, **blending together** fields like meteorology, oceanography, biology, and atmospheric sciences*


1991: Earth Science Enterprise

1999: Earth Observing System



*EOS will observe the key physical variables needed to advance understanding of the entire Earth system and develop a **deeper comprehension** of the **components** of that system and the **interactions** among the components*

The A-Train



24 EOS Measurements



ATMOSPHERE	Cloud Properties (amount, optical properties, height)	MODIS, GLAS, AMSR-E, MISR, AIRS, ASTER, SAGE III
	Radiative Energy Fluxes (top of atmosphere, surface)	CERES, ACRIM III, MODIS, AMSR-E, GLAS, MISR, AIRS, ASTER, SAGE III
	Precipitation	AMSR-E
	Tropospheric Chemistry (ozone, precursor gases)	TES, MOPITT, SAGE III, MLS, HIRDLS, LIS
	Stratospheric Chemistry (ozone, ClO, BrO, OH, trace gases)	MLS, HIRDLS, SAGE III, OMI, TES
	Aerosol Properties (stratospheric, tropospheric)	SAGE III, HIRDLS MODIS, MISR, OMI, GLAS
	Atmospheric Temperature	AIRS/AMSU-A, MLS, HIRDLS, TES, MODIS
	Atmospheric Humidity	AIRS/AMSU-A/HSB, MLS, SAGE III, HIRDLS, Poseidon 2/JMR/DORIS, MODIS, TES
	Lightning (events, area, flash structure)	LIS
SOLAR RADIATION	Total Solar Irradiance	ACRIM III, TIM
	Solar Spectral Irradiance	SIM, SOLSTICE

24 EOS Measurements



LAND	Land Cover & Land Use Change	ETM+, MODIS, ASTER, MISR
	Vegetation Dynamics	MODIS, MISR, ETM+, ASTER
	Surface Temperature	ASTER, MODIS, AIRS, AMSR-E, ETM+
	Fire Occurrence <i>(extent, thermal anomalies)</i>	MODIS, ASTER, ETM+
	Volcanic Effects <i>(frequency of occurrence, thermal anomalies, impact)</i>	MODIS, ASTER, ETM+, MISR
	Surface Wetness	AMSR-E
OCEAN	Surface Temperature	MODIS, AIRS, AMSR-E
	Phytoplankton & Dissolved Organic Matter	MODIS
	Surface Wind Fields	SeaWinds, AMSR-E, Poseidon 2/JMR/DORIS
	Ocean Surface Topography <i>(height, waves, sea level)</i>	Poseidon 2/JMR/DORIS

24 EOS Measurements



CRYOSPHERE

Land Ice <i>(ice sheet topography, ice sheet volume change, glacier change)</i>	GLAS, ASTER, ETM+
Sea Ice <i>(extent, concentration, motion, temperature)</i>	AMSR-E, Poseidon 2/JMR/DORIS, MODIS, ETM+, ASTER
Snow Cover <i>(extent, water equivalent)</i>	MODIS, AMSR-E, ASTER, ETM+